


# ДО ГРУП НАЙВИЩОГО РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ НАЛЕЖАТЬ:

- 1 Особи, які мали сімейний, близький чи професійний контакт з хворим на туберкульоз
- 2 Особи, які живуть з ВІЛ
- 3 Особи з вперше виявленими фіброзними залишковими змінами в легенях, які не отримували лікування від туберкульозу
- 4 Особи з захворюваннями, що призводять до ослаблення імунітету (хворі зі злоякісними новоутвореннями, цукровим діабетом, пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію, терапію фактором некрозу пухлини (ФНП-а))
- 5 Медичні працівники
- 6 Затримані та заарештовані особи, які перебувають у закладах тимчасового утримання; особи, які утримуються або звільнились з установ пенітенціарної системи; персонал зазначених закладів
- 7 Пацієнти і персонал психіатричних закладів, пансіонатів для інвалідів
- 8 Особи без визначеного місця проживання
- 9 Особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики
- 10 Особи, які працюють або працювали у виробничих умовах із впливом діоксиду силіціуму (наприклад, шахтарі і працівники металургічної промисловості)
- 11 Особи, які перебувають за межею бідності, безробітні
- 12 Військовослужбовці
- 13 Мігранти (у тому числі внутрішньо переміщені особи)



## СКРИНІНГОВА АНКЕТА

Пацієнту необхідно негайно обстежитись на туберкульоз, якщо Ви відзначили понад три пункти (особливо небезпечними є перші сім)

Чи є у пацієнта кашель або покашлювання понад 2 тижні?

Чи наявна підвищена втомлюваність та слабкість?

Чи має підвищену пітливість, особливо вночі?

Чи зменшилась вага тіла з невизначених причин?

Чи наявне підвищення температури тіла?  
(має значення навіть незначне підвищення – до 37–37,2°C)

Чи турбує задишка при незначному фізичному навантаженні?

Чи турбує біль у грудній клітці?

Чи має пацієнт ВІЛ-інфекцію, діабет або інше захворювання, що призводить до зниження імунітету?

Чи отримує лікування преднізолоном або іншими препаратами, що впливають на імунітет (застосовуються при лікуванні злоякісних новоутворень, бронхіальної астми, ревматоїдного артриту тощо)?

Чи був контакт із хворим на туберкульоз впродовж останніх 6 місяців?

**HEALTH  
LINK**

Матеріал видано за фінансової підтримки БО «100% ЖИТЯ» в межах реалізації проекту HealthLink: «Прискорення зусиль з протидією ВІЛ в Україні» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Національна гаряча лінія з питань туберкульозу:


**0 800 503 080**

Національна гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІДу:

**0 800 500 451**

Більше інформації про життя з ВІЛ в Україні:

[prozdorovia.in.ua](http://prozdorovia.in.ua)




# ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПОТРЕБУЄ ПАЦІЄНТ

## ОБСТЕЖЕННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ?



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я



Національна служба  
здоров'я України

